



Progression de la loutre d'Europe en DRÔME

Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Mammifères Mustélidés

La loutre, mammifère semi aquatique de la famille des mustélidés, est une espèce aux mœurs particulièrement discrètes. Elle est plutôt crépusculaire et nocturne.

A partir des années 1920, les populations commencent à régresser dans l'est et le nord, et ce mouvement s'amplifie jusque dans les années 1970 où l'espèce ne se maintient correctement que sur la façade atlantique et dans le limousin, soit 10 départements. Chassée et piégée par milliers chaque année pour sa fourrure, victime de l'aménagement des rivières, de l'assèchement des zones humides et de la pollution, elle faillit bien disparaître.

Dans les années 1980, ce processus s'inverse. Les naturalistes observent un mouvement de recolonisation à partir des départements de la Creuse et de la Corrèze. En 1993, la loutre est notée présente dans 20 départements.

Pour le département de l'Ardèche en 2009 et 2010, on trouve la loutre dans la majorité des rivières et leurs affluents (Ardèche, Chassezac, Eyrieux, Doux). Pour le département de la Drôme, des indices de présence de la loutre ont été observés ces deux dernières années sur le Lez, en aval de Grignan (partie vauclusienne comprise) et son affluent l'Hérein. Idem sur les rivières du Tricastin (Lauzon notamment) et sur le Rhône, de la confluence de la Cèze jusqu'à Ancône, au nord de Montélimar.

On constate une progression pour le département de la Drôme en 2010. Des indices de présence de la loutre sont observés sur la Berre, sur l'Eygues en aval de Nyons, sur le Roubion et le Jabron, et dernièrement sur la rivière Drôme. Les dernières prospections en octobre 2010 sur le secteur des Ramières, en aval de Crest, ont été très positives. Nous avons ainsi recensé une vingtaine d'épreintes sur cinq des six zones parcourues. Je remercie la trentaine de participants aux trois prospections de cet automne.

Les épreintes sont l'indice le plus fiable de présence et le plus sûr, car très caractéristiques de l'espèce: elles dégagent une forte odeur de poisson, d'huile de lin, de miel, et se composent de reliefs d'écaillés, d'os d'amphibiens et d'arêtes.

Des prospections sur les rivières drômoises seront à réaliser début 2011 pour confirmer la présence de la loutre et d'autres cours d'eau seront également parcourus l'année prochaine. Des prospections qui, espérons le, réserveront d'autres belles surprises.

Un constat en Rhône-Alpes: seul le département de l'Ardèche possède une population remarquable, qui alimente du fait de son expansion nos rivières drômoises. De plus, le Rhône confirme son rôle de couloir de colonisation efficace pour la loutre.

Le Réseau Loutre Rhône-Alpes est un réseau fonctionnant sous l'égide du CORA Faune Sauvage en s'appuyant sur des structures associatives et des bénévoles naturalistes dans les huit départements de Rhône-Alpes.

Correspondant DROME pour le Réseau Loutre RHÔNE ALPES – LPO DROME

JEAN-JACQUES.PEYRARD@wanadoo.fr

CORA. : Centre Ornithologique Rhône-Alpes